20.

Monsieur Daucrée me en chirurgie, et chirurgien major de pierre Encise, a envoyé a l'academie l'observation qui suit

un homme tenant a sa main une bouteille de verre fit une chute, un des fragmens de la bouteille, lui perça la Region epigastrique, et ouvrit son estomac, cette ouverture étoit de haut en bas dans un endroit de la grande arcade, elle avoit une pouce moins quelque ligne d'étendues, celle des parties exterieures étoit d'un pouce et demi; le malade avoit beaucoup mangé, il vomit les alimens qu'il avoit pris, et eut d'ailleurs les autres symptomes qui succédent a ces sortes de plaies. L'estomac se trouvoit étranglé dans le lieu de sa division par la plaie exterieure qu'il debordoit; L'auteur fit la suture a la plaie de l'estomac, et pour le faire Rentrer il dilata les tegumens dit-il auxquels il fit ensuite la suture. Le malade mangea clandestinement dés le quatrième jour et continua les jours suivans sans avoir été incommodé: il y a plusieurs exemples de sutures faites avec succés aux plaies de l'estomac; il y en a même quelques-uns d'extraordinaires si on vouloit les croire, ou les plaies de cet organe ont été cousues avec la plaie exterieure, même avec la peau seule

L'auteur ne nous dit pas s'il a fait quelque tentative pour Reduire l'estomac avant de dilater la plaie exterieure, il n'a dilaté que les tegumens qui ne paroissent guère propres a étrangler les parties sorties, et dans une plaie tout Recemment faite. L'estomac lui même étant dans ce cas-ci flasque et vuide d'alimens, ne paroit pas non plus susceptible d'étranglement, et moins encore dans le lieu de sa division; la Reduction auroit du Reussir; et je crois que la suture exterieure peut être Regardée comme superflue

je pense cependant que l'academie peut accueillir cette observation pour servir au besoin   Dupouy

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 57 n° 6